

## **فصل سوم:**

# **مواد و روش ها**

### **۳-۱- نوع پژوهش**

کارآزمایی بالینی تصادفی شده

### **۲-۳- جامعه مورد بررسی، خصوصیات افراد مورد مطالعه**

مطالعه حاضر، یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده است که ببروی ۱۰۶ نوزاد ترم ۳ تا ۰ روزه که به دلیل زردی در بخش نوزادان بیمارستان ۱۷ شهریور شهر رشت در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ بستره شدند و براساس معیارهای ورود و خروج واجد شرایط شرکت در مطالعه بودند، صورت گرفت.

### **۲-۱- معیارهای ورود به مطالعه**

- رضایت کامل والدین از حضور نوزادان در مطالعه
- نوزادان با سنین ۳ تا ۰ روزه
- وزن زمان تولد بین ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ گرم
- تغذیه انصاری با شیرمادر
- سن بارداری ۳۸ تا ۴۱ هفته و ۶ روز
- بیلی‌روبین تام سرمی ۱۴ تا ۲۰ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر و بیلی‌روبین مستقیم کمتر از ۲ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر

### **۲-۲- معیارهای عدم ورود به مطالعه**

- سابقه وجود هرگونه بیماری نورولوژیک، نوزادان با سابقه تشنج، بیماری مزمن
- هیپربیلی روبینی مستقیم
- سپتیسمی
- بیماری‌های منجر به هیپربیلی روبینی شامل سندرم کریگلر نجار، سندروم ژیلبرت، هیپرتیروئیدی، هیپوتیروئیدی و بیماری‌های کبدی و انسداد مجرای صفراوی
- سابقه‌ی دیابت مادر