


ساعات شروع: ۷:۳۰ صبح	رشته: علوم تجربی	تعداد صفحه: ۳	سوالات آزمون شبه نهایی درس فیزیک ۳
مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۲/۱۶	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش	سوالات آزمون شبه نهایی (آمادگی برای آزمون‌های نهایی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴		

ردیف	سوالات (پاسخ برگ دارد)	نمره
۱	درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را با کلمه‌های "درست" و "نادرست" در پاسخ برگ مشخص کنید. الف) پاره خط جهتی داری که مکان آغازین حرکت را به مکان پایانی حرکت وصل می‌کند، بردار جابه جایی نامیده می‌شود. ب) شتاب متوسط متحرک بین دو لحظه از زمان برابر شیب پاره خطی است که نقاط نظیر آن دو لحظه در نمودار سرعت- زمان را به یکدیگر وصل می‌کند. ج) طبق قانون سوم نیوتن، نیروهای کنش و واکنش همواره به دو جسم وارد می‌شوند و هم نوع‌اند. د) در حرکت چتر باز با تندی حدها به طرف پایین، اندازه‌ی نیروی وزن بزرگتر از اندازه‌ی نیروی مقاومت هوا است. ه) هر چه ارتفاع ماهواره از سطح زمین بیشتر شود، نیروی گرانشی زمین بر آن، افزایش می‌یابد.	۱.۲۵
۲	شکل زیر نمودار مکان- زمان متحرکی را که در راستای محور X حرکت می‌کند، نشان می‌دهد. در هر یک از جملات زیر عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید و در پاسخ برگ بنویسید. الف) در بازه زمانی t_1 تا t_2 حرکت متحرک (تند شونده - کند شونده) است. ب) در (لحظه t_1 - لحظه t_2) بردار مکان جسم تغییر جهت داده است. ج) در بازه زمانی صفر تا t_2 تندی متوسط متحرک با اندازه سرعت متوسط آن (برابر - نابرابر) است. د) در بازه زمانی t_1 تا t_2 متحرک در (جهت - خلاف جهت) محور X حرکت کرده است.	۱.۲۵
۳	جسمی با سرعت ثابت بر مسیری مستقیم در حرکت است. اگر جسم در لحظه $t_1 = 1s$ در مکان $X_1 = 8m$ و در لحظه $t_2 = 3s$ در مکان $X_2 = 2m$ باشد، معادله مکان- زمان آن را بنویسید.	۱.۲۵
۴	خودرویی که در جاده‌ای مستقیم در حال حرکت است، مانعی را در فاصله ۴۵ متری خود دیده و اقدام به ترمز می‌کند. اگر معادله سرعت- زمان این متحرک در SI بصورت $v = -5t + 20$ باشد. الف) آیا جسم به مانع برخورد می‌کند؟ (با انجام محاسبات لازم پاسخ دهید) ب) چند ثانیه طول می‌کشد تا متحرک به طور کامل متوقف شود؟	۱.۲۵
۵	فنری به طول $L_1 = 20cm$ را از یک نقطه آویزان می‌کنیم و به سر دیگر آن وزنه ۱۰۰ گرمی وصل می‌کنیم. پس از رسیدن به تعادل، طول فنر به $L_2 = 25cm$ می‌رسد. ثابت فنر چند نیوتن بر متر است؟ ($g = 10N/kg$)	۱
۶	مطابق شکل مقابل نیروی ثابت $F = 140N$ در راستای افقی به جسمی به جرم $20kg$ وارد می‌شود. اگر ضریب اصطکاک ایستایی و جنبشی جعبه و سطح به ترتیب 0.6 و 0.4 باشد، اندازه و نوع نیروی اصطکاک بین جسم و سطح را تعیین کنید. ($g = 10N/kg$)	۱.۲۵
۷	شکل زیر، منحنی نیروی خالص بر حسب زمان را برای متحرکی نشان می‌دهد که از حال سکون شروع به حرکت کرده است. اگر انرژی جنبشی جسم بعد از ۸s به اندازه $120J$ باشد، جرم جسم را بدست آورید.	۱.۲۵


ساعات شروع: ۷:۳۰ صبح	رشته: علوم تجربی	تعداد صفحه: ۳	سوالات آزمون شبه نهایی درس فیزیک ۳
مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۲/۱۶	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش	سوالات آزمون شبه نهایی (آمادگی برای آزمون‌های نهایی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴		

ردیف	سوالات (پاسخ برگ دارد)	نمره
------	------------------------	------

۸	هر یک از جمله‌های زیر را با استفاده از عبارت‌های داده شده کامل کنید و در پاسخ برگ بنویسید. (ممکن است یک عبارت بیش از یک بار استفاده شود) بسامد طبیعی - بسامد واداشته - افزایش - کاهش الف) نوسانگر با انحراف از وضع تعادل با بسامد معین شروع به نوسان می‌کند. به بسامد این نوسان..... گفته می‌شود. ب) در سامانه جرم - فنر با افزایش جرم نوسان کننده، دوره نوسان..... می‌یابد. ج) اگر در طول طیف امواج الکترومغناطیسی از امواج رادیویی به طرف پرتوهای گاما حرکت کنیم، بسامد..... می‌یابد. د) آمبولانسی به سمت شنونده ساکن حرکت می‌کند، اندازه طول موج در جلو آمبولانس نسبت به پشت آن..... می‌یابد.	۱
۹	معادله حرکت یک نوسانگر هماهنگ ساده در SI بصورت $x = A \cos(2\pi ft)$ است. الف) بسامد این نوسانگر چند هرتز است؟ ب) اگر جرم نوسانگر $200g$ باشد، انرژی مکانیکی آن را بدست آورید. ($\pi^2 = 10$) ج) در بازه زمانی صفر تا $1/10$ ثانیه، نوسانگر چه مسافتی را طی می‌کند؟	۱.۷۵
۱۰	آزمایشی را طراحی کرده و شرح دهید که بتوان به کمک آن تندی صوت در هوا را اندازه‌گیری کرد.	۱
۱۱	توان متوسط یک منبع صوتی $30W$ است. الف) شدت صوت در فاصله 5 متری منبع صوت چند وات بر متر مربع است؟ ($\pi = 3$) ب) تراز شدت این صوت چند دسی بل است؟ ($I_0 = 10^{-12} W/m^2$)	۱.۲۵
۱۲	به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید. الف) چرا به موج‌های عرضی و طولی، موج‌های پیش‌رونده گفته می‌شود؟ ب) دو مورد را نام ببرید که در آن از مکان‌یابی پژواکی استفاده شده است.	۱
۱۳	شکل زیر یک مدل‌سازی از پدیده سراب است که تغییر جبهه‌های موج و خمیدگی مربوط به آن را در روزهای بسیار گرم و نزدیک سطح زمین نشان می‌دهد. با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) جبهه‌های موج در کدام محیط با تندی بیشتری حرکت می‌کنند؟ ب) دمای کدام محیط بیشتر است؟ ج) ضریب شکست کدام محیط بیشتر است؟ 	۰.۷۵
	صفحه ۲ از ۳	

ساعات شروع: ۷:۳۰ صبح	رشته: علوم تجربی	تعداد صفحه: ۳	سوالات آزمون شبه نهایی درس فیزیک ۳
مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۲/۱۶	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش	سوالات آزمون شبه نهایی (آمادگی برای آزمون های نهایی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴		

ردیف	سوالات (پاسخ برگ دارد)	نمره
------	------------------------	------

۱۴	در جدول زیر برای هر گزاره از ستون (۱)، عبارت مناسب را از ستون (۲) انتخاب کنید و در پاسخ برگ بنویسید. (یک عبارت در ستون (۲) اضافی است)	
	ستون (۱)	ستون (۲)
۱	الف) در گسیل، فوتون در جهتی کاتوره ای گسیل می شود.	پوزیترون
	ب) ذره گسیل شده توسط هسته در واپاشی β^+ ، نامیده می شود.	نوترون
	ج) در واپاشی β^- ، یک نوترون درون هسته، به و الکترون تبدیل می شود.	خود به خود
	د) در ایزوتوپ های سنگین ($Z > 83$)، اگر هسته بخواهد پایدار باقی بماند، باید تعداد درون هسته افزایش یابد.	القایی پروتون
۱۵	یک چشمه نور فوتون هایی با طول موج 600nm گسیل می کند. اگر در هر ثانیه 9×10^{20} فوتون گسیل شود، توان تابشی این چشمه نور چند وات است؟ ($hc = 2 \times 10^{-25} \text{ J.m}$)	۰.۷۵
۱۶	الکترونی در دومین حالت برانگیخته اتم هیدروژن قرار دارد. کوتاهترین طول موجی که امکان گسیل آن وجود دارد چند نانومتر است؟ ($R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$)	۱
۱۷	به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) دو مورد از نارسایی های مدل اتمی رادرفورد را بنویسید. ب) منظور از خط های فرانیهوفر چیست؟	۱
۱۸	شکل زیر نمودار تغییرات تعداد هسته های مادر پرتوزای موجود در یک ماده پرتوزا را بر حسب زمان نشان می دهد. الف) نیمه عمر این عنصر چند ساعت است؟ ب) پس از گذشت ۴۰ ساعت چه کسری از هسته های اولیه واپاشیده می شود؟	۱.۲۵
		۲۰
موفق باشید		
صفحه ۳ از ۳		

راهنمای تصحیح آزمون شبه نهایی درس فیزیک ۳	تعداد صفحه: ۲	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۷:۳۰ صبح
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۲/۱۶	نام و نام خانوادگی:	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
راهنمای تصحیح آزمون شبه نهایی (آمادگی برای آزمون‌های نهایی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴			

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف- درست ب- درست ج- درست د- نادرست ه- نادرست هر مورد (۰/۲۵)	۱.۲۵
۲	الف- تندشونده ب- لحظه‌ی t_2 ج- نابرابر د- خلاف جهت هر مورد (۰/۲۵)	۱
۳	$V_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ (۰/۲۵) $x = vt + x_0$ (۰/۲۵) $x = -3t + 11$ (۰/۲۵) ص ۲۴	۱.۲۵
۴	الف) $\Delta x = 40 \text{ m}$ (۰/۲۵) برخورد نمی‌کند. ب) $(-3)^2 = 2(-5)\Delta x$ (۰/۲۵) $0 = -5t + 20 \Rightarrow t = 4 \text{ s}$ (۰/۲۵) ص ۱۸	۱.۲۵
۵	$\Delta x = x_2 - x_1 = 25 - 20 = 5 \text{ cm} \Rightarrow \Delta x = 0.05 \text{ m}$ (۰/۲۵) $kx = mg$ (۰/۲۵) $k \times (0.05) = 0.1 \times 10$ (۰/۲۵) $k = 20 \text{ N/m}$ (۰/۲۵) ص ۴۲	۱
۶	$F_N = mg$ (۰/۲۵) $F > f_{s \max}$ (۰/۲۵) $f_k = \mu_k F_N = 0.4 \times 200 = 80 \text{ N}$ (۰/۲۵) $f_{s \max} = \mu_s F_N = 0.6 \times 200 = 120 \text{ N}$ (۰/۲۵) $\Rightarrow$ نیروی اصطکاک از نوع جنبشی است (۰/۲۵) ص ۳۷	۱.۲۵
۷	$s = \Delta p$ (۰/۲۵) $\Delta p = p_r - p_i \Rightarrow 24 = p_r - 0$ $K = \frac{p^2}{2m}$ (۰/۲۵) $120 = \frac{(24)^2}{2m} \Rightarrow m = 2/4 \text{ kg}$ (۰/۲۵) ص ۴۴	۱.۲۵
۸	الف) بسامد طبیعی ب) افزایش ج) افزایش د) کاهش هر مورد (۰/۲۵)	۱
۹	الف) $\omega = 2\pi f$ (۰/۲۵) $E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$ (۰/۲۵) ج) نوسانگر در مدت زمان ۰/۱ ثانیه که به اندازه یک دوره تناوب است، از A شروع به حرکت کرده است و دوباره به A برگشته. بنابراین دو بار پاره خط نوسان را طی کرده است. $l = 4A$ (۰/۲۵) $l = 4 \times 0.04 = 0.16 \text{ m}$ (۰/۲۵) ص ۵۵	۱.۷۵
	صفحه ۱ از ۲	

راهنمای تصحیح آزمون شبه نهایی درس فیزیک ۳	تعداد صفحه: ۲	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۷:۳۰ صبح
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۰۲/۱۶	نام و نام خانوادگی:	مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه
راهنمای تصحیح آزمون شبه نهایی (آمادگی برای آزمون های نهایی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴			

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۰	دو میکروфон که در فاصله معین قرار داده شده اند را به یک زمان سنج حساس متصل کنید. وقتی چکش را به صفحه فلزی بکوبیم، امواج صوتی که به سمت دو میکروفون روانه می شوند، نخست میکروفون نزدیک تر و سپس میکروفون دورتر را متاثر می سازند. (۰/۲۵) اختلاف فاصله میکروفون ها از محل برخورد چکش با صفحه فلزی را اندازه می گیریم. (۰/۲۵) سپس تاخیر زمانی بین دریافت صوت توسط دو میکروفون را ثبت می کنیم. (۰/۲۵) اکنون با استفاده از رابطه $v = \Delta x / \Delta t$ می توانیم تندی صوت را در هوا بیابیم. (۰/۲۵) ص ۷۱	۱
۱۱	الف) $I = \frac{P}{A}$ (۰/۲۵) ب) $\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$ (۰/۲۵) ص ۷۲	۱.۲۵
۱۲	الف- زیرا هر دوی این موج ها از نقطه ای به نقطه دیگر حرکت کرده (۰/۲۵) و انرژی را با خود منتقل می کنند. (۰/۲۵) ب- ذکر دو مورد (خفاش، دلفین، دستگاه سونار، سونوگرافی، تندی شارش خون، تعیین تندی خودرو). هر مورد (۰/۲۵) ص ۷۹، ۶۲	۱
۱۳	الف- محیط (۲) ب- محیط (۲) ج- محیط (۱) ص ۸۷	۰.۷۵
۱۴	الف- خود به خود ب- پوزیترون ج- پروتون د- نوترون ص ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۴، ۱۱۰	۱
۱۵	الف- $P = 300 W$ (۰/۲۵) ص ۹۸	۰.۷۵
۱۶	الف- $\lambda = 112 / 5 nm$ (۰/۲۵) ص ۱۰۱	۱
۱۷	الف- نتوانست پایداری اتم را توجیه کند (۰/۲۵) گسسته بودن طیف امواج الکترومغناطیسی گسیل شده از اتم را نتوانست توجیه کند. (۰/۲۵) ب- خط های تاریکی (۰/۲۵) که در طیف خورشید (۰/۲۵) دیده می شود. ص ۱۰۴، ۱۰۷	۱
۱۸	الف- $T_1 = 1.0 h$ (۰/۲۵) ب) ص ۱۲۰	۱.۲۵
۲۰	موفق باشید صفحه ۲ از ۲	